

Zonificación y compartimentación


Las normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, fundada como OIE) para zonificación y compartimentación ayudan a los Miembros a prevenir y controlar la propagación de enfermedades y contribuyen a garantizar el comercio seguro de animales y mercancías relacionadas. A través de su Informe anual, el **Observatorio** pretende evaluar la aplicación de dichas normas.

Un número creciente de Miembros informa sobre la aplicación de la zonificación, pero la implementación efectiva sigue siendo un desafío

71% de los Miembros declara zonificación para al menos una enfermedad,

particularmente para controlar influenza aviar de alta patogenicidad, fiebre aftosa, enfermedad de Newcastle, peste porcina africana, peste porcina clásica y peste de los pequeños rumiantes

Fuente: Informes semestrales de WAHIS, 2019



Fuente: Informes semestrales de WAHIS, 2005-2019

En promedio, los Miembros declaran zonificación para

14 a 20

enfermedades por año sin mayores variaciones con el tiempo, pero con alguna variabilidad entre regiones.

Fuente: Informes semestrales de WAHIS, 2005-2019

Algunos Miembros notifican la presencia de una enfermedad limitada a una o más zonas, pero no siempre declaran aplicar zonificación para controlarla

Algunos miembros declaran aplicar zonificación sin medidas de control de desplazamientos, a pesar de que los controles de desplazamientos son un requisito para la implementación efectiva de la zonificación

Algunos miembros declaran aplicar zonificación como medida de control de una enfermedad, a pesar de notificar su ausencia en el territorio

Estudios de caso: peste porcina africana (PPA)

46% de los Miembros que declaran presencia de PPA restringida a una o más zonas también declaran aplicar zonificación.

86% de los Miembros que declaran aplicar zonificación también declaran aplicar control de desplazamientos para contener la PPA.

De los 38 Miembros que declaran aplicar zonificación para controlar la enfermedad,

49% notificaron su ausencia de todo el territorio o nunca la notificaron.

Fuente: Informes semestrales de WAHIS, 2.º semestre de 2019

Un número limitado de Miembros declara aplicar compartimentación para al menos una enfermedad, aunque la tendencia aumenta ligeramente



Fuente: Informes semestrales de WAHIS, 2017-2021

La capacidad de los Miembros en cuanto a la zonificación y la compartimentación sigue siendo limitada

A partir de los resultados de recientes misiones de evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (PVS), el porcentaje de Miembros que alcanzaron o excedieron la capacidad mínima es:

29%

Zonificación

14%

Compartimentación

Fuente: Misiones de evaluación o seguimiento PVS, 2016-2021 - Análisis del nivel de progresión en las competencias crítica IV-7. y IV-8. de la 6ª edición de la Herramienta PVS

Recomendaciones

Organización Mundial de Sanidad Animal

- Aclarar mejor que la ausencia de una enfermedad en una o varias zonas solo debe notificarse si se han aplicado medidas de zonificación.
- Supervisar la progresión de los Miembros en las competencias críticas como un indicador del apoyo de la OMSA.

Miembros

- Implementar zonificación junto con el control de desplazamientos.
- Considerar aplicar más las normas de zonificación y compartimentación.

Toda la información está disponible [aquí](#)

Al consultar este documento, tenga en cuenta que los datos presentados en el informe completo son limitados.